

FICHE INFO PATIENT



FICHE CRÉÉE EN : AVANT 2012
DERNIERE MISE A JOUR : NOVEMBRE 2018

FICHE REMISE LE/...../.....

PAR DR

Madame, Monsieur,

Cette fiche, rédigée par l'Association Française d'Urologie est un document destiné à vous aider à mieux comprendre les informations qui vous ont été expliquées par votre urologue à propos de votre maladie et des choix thérapeutiques que vous avez faits ensemble.

En aucune manière ce document ne peut remplacer la relation que vous avez avec votre urologue. Il est indispensable en cas d'incompréhension ou de question supplémentaire que vous le renvoyez pour avoir des éclaircissements.

Vous sont exposées ici les raisons de l'acte qui va être réalisé, son déroulement et les suites habituelles, les bénéfiques et les risques connus même les complications rares.

Prenez le temps de lire ce document éventuellement avec vos proches ou votre médecin traitant, renvoyez votre urologue si nécessaire. Ne vous faites pas opérer s'il persiste des doutes ou des interrogations.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site : www.urologie-santé.fr

IMPLANT PÉNIEN (PROTHÈSE D'ÉRECTION)

Votre urologue se tient à votre disposition pour tout renseignement.

La mise en place d'un implant pénien (encore appelé prothèse pénienne ou prothèse d'érection) est un des traitements de la dysfonction érectile. L'intervention consiste en la mise en place à l'intérieur des corps caverneux du pénis de matériel semi-rigide ou gonflable destiné à donner une rigidité permettant la pénétration lors des rapports sexuels.

— L'ORGANE

Le pénis est l'organe de la copulation (rapport sexuel) et de la miction. Il est constitué de deux corps caverneux et d'un corps spongieux entourant l'urètre (canal à travers lequel s'écoule l'urine) et qui se termine par le gland.

Les corps caverneux sont recouverts d'une membrane épaisse, l'albuginée. Le pénis est recouvert d'une peau (le fourreau) qui se termine par un repli qui recouvre le gland (le prépuce). L'innervation et la vascularisation du

pénis sont assurées par des artères et des nerfs qui se trouvent le long de la face dorsale (face visible par l'homme lorsque le pénis est flaccide).

PRINCIPE DE L'INTERVENTION

Remplacer les capacités érectiles naturelles des corps caverneux du pénis par la mise en place d'implants semi-rigides (malléables) ou gonflables.

↳ Qu'est-ce qu'un implant pénien ?

C'est un dispositif médical qui est implanté dans les corps caverneux (corps érectiles de la verge) défaillants. Il n'est donc pas apparent de l'extérieur, mais il est intégré dans l'appareil génital masculin.

Les composants de l'implant sont des biomatériaux inertes, connus pour être généralement bien acceptés par l'organisme humain.

Cette intervention est en principe réservée à des hommes qui ont des troubles sévères et irréversibles de l'érection, quelle qu'en soit la cause, et chez lesquels les autres traitements (médicaments oraux, injections intracaverneuses, autres traitements locaux) ont échoué, sont contre-indiqués ou trop contraignants pour des raisons techniques ou économiques.

PRÉPARATION À L'INTERVENTION

Toute intervention chirurgicale nécessite une préparation qui peut être variable selon chaque individu. Il est indispensable que vous suiviez les recommandations qui vous seront données par votre urologue et votre anesthésiste. En cas de non-respect de ces recommandations, l'intervention pourrait être reportée.

Aucun examen complémentaire n'est obligatoire avant l'intervention en dehors des examens de

sang et urinaires (ECBU) habituels. Des examens spécifiques à votre état de santé peuvent éventuellement être prescrits par l'anesthésiste ou votre chirurgien. Un écho-Doppler ou une IRM du pénis sont parfois demandés dans des cas particuliers.

Une infection urinaire peut faire reporter l'intervention et doit être traitée auparavant. Les traitements antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants doivent être arrêtés avant l'intervention lorsque cela est possible (avis du cardiologue ou médecin généraliste) ou remplacés.

Une antibio-prophylaxie est réalisée systématiquement et parfois associée à l'utilisation d'antibiotiques directement appliqués sur le matériel prothétique.

DÉROULEMENT DE L'INTERVENTION

L'admission a lieu la veille ou le matin de l'intervention. Ceci permet les dernières évaluations et préparatifs à l'intervention. Le type d'anesthésie (rachianesthésie ou anesthésie générale) est choisi par le médecin anesthésiste en fonction de critères médicaux et peut tenir compte, dans la limite du possible, des souhaits du patient.

Votre urologue vous a préalablement expliqué les différents modèles d'implants avec leurs avantages, inconvénients, risques et limites. La décision finale reviendra cependant à votre urologue durant l'intervention, car des contraintes techniques non prévisibles avant l'intervention peuvent modifier le choix: mise en place d'un implant semi-rigide en lieu et place d'un implant gonflable, impossibilité technique de mettre en place un implant de quelque type que ce soit.

Le site d'incision (voie d'abord) dépend du matériel choisi, des habitudes de l'urologue et des conditions anatomiques du patient. Cela est précisé autant que possible lors des consultations pré-opératoires, mais peut être modifié en fonction d'impératifs techniques de dernière minute. Les voies d'abord les plus utilisées sont :

- L'incision péno-scrotale, à la partie basse du pénis et la partie haute des bourses.
- L'incision supra-pubienne, devant le pubis, au-dessus de la racine du pénis.
- Parfois une voie mixte est effectuée, associant les deux précédentes voies.
- Une incision complémentaire est parfois nécessaire au niveau abdominal pour le réservoir et au niveau coronal (circulaire sous le gland) pour des cas complexes.

Le matériel prothétique est implanté par le chirurgien urologue selon les recommandations du fabricant du matériel choisi et en fonction des conditions locales (fibrose des corps caverneux, interventions précédentes).


- En cas d'implant malléable, le chirurgien positionne un implant dans chaque corps caverneux.
- Lorsqu'une prothèse à 2 compartiments est mise en place en plus des implants caverneux, une pompe est placée dans les bourses entre les testicules.
- Lorsqu'un implant à 3 compartiments est mis en place en plus des implants caverneux et de la pompe, un réservoir est situé dans l'abdomen.

L'hospitalisation est en général courte de 24 à 72 heures.

— QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D'IMPLANTS ?

LES IMPLANTS MALLÉABLES (OU SEMI-RIGIDES)

Ce sont des implants en silicone dont l'axe est armé par un matériau qui lui confère la rigidité nécessaire au rapport sexuel et la « mémoire » après orientation manuelle (l'implant conserve la forme qu'on lui donne).



↳ Avantages

- Intervention chirurgicale plus simple et plus rapide.
- Risque infectieux plus faible.
- Facile à utiliser : il suffit de redresser manuellement la verge.

↳ Inconvénients

- Reste toujours rigide même en dehors des rapports sexuels après abaissement manuel de la verge.
- Peut gêner un acte endoscopique urologique à réaliser par l'urètre (conduit urinaire situé dans la verge).
- Peut gêner l'habillement ou la vie quotidienne selon les activités du patient.

↳ Risques propres

- Possibilité de fracture de la prothèse, le plus souvent par manœuvre traumatique. Nécessite alors le remplacement de l'implant.
- Douleur chronique avec ou sans érosion du gland, pouvant nécessiter l'explantation et le remplacement par un implant plus court.
- Phimosis : la peau du prépuce s'avère trop serrée une fois la prothèse en place, ne permettant pas ou difficilement le décalottage du gland. Peut être facilement corrigé par une plastie (élargissement de l'anneau du prépuce) ou une posthectomie.

LES IMPLANTS GONFLABLES À 2 COMPARTIMENTS

Les deux corps de l'implant sont des cylindres creux reliés à un réservoir et munis d'une pompe. Le pénis est donc souple en flaccidité (au repos) et se gonfle par des pressions répétées sur la pompe qui remplit ainsi les cylindres,

permettant à la verge de se mettre en érection. Par pression sur un autre endroit de la pompe ou de l'implant pénien (suivant les modèles), les cylindres se vident et permettent un retour de la verge à l'état flaccide.

↳ Avantages


- Meilleure flaccidité que l'implant malléable.
- Assez simple d'emploi mais nécessite un apprentissage et une certaine dextérité.

↳ Inconvénients et risques propres

- Parfois difficile à manipuler.
- Flaccidité moins naturelle qu'avec l'implant à 3 compartiments.
- Pompe- réservoir palpable et parfois visible au niveau des bourses.
- Possibilités de fuites ou de mauvais fonctionnement de la pompe nécessitant une réintervention (révision).

LES IMPLANTS GONFLABLES À 3 COMPARTIMENTS

Les cylindres sont placés dans les corps caverneux. Une pompe située dans les bourses permet de gonfler ou dégonfler l'implant pénien. La pompe est elle-même raccordée à un réservoir d'eau situé devant la vessie.



↳ Avantages

- Implant le plus proche d'une sensation naturelle, que ce soit au repos ou en érection.
- Pompe plus petite, donc moins perceptible dans les bourses.

↳ Inconvénients et risques propres

- Nécessite un apprentissage et une certaine

habileté.

- Risques de fuites ou de mauvais fonctionnement comme avec l'implant à 2 compartiments.
- Risque de déformation au niveau des cylindres.

SUITES OPÉRATOIRES ET RETOUR À DOMICILE

Le retrait des pansements, drains et sondes s'effectue habituellement le lendemain de l'intervention et le retour à domicile peut s'effectuer le lendemain ou les jours qui suivent après vérification de l'état local. Des soins de cicatrice peuvent être réalisés par un(e) infirmier(e) à domicile ou par le patient lui-même quelques jours après l'intervention.

Des antalgiques sont prescrits à la sortie.

Le patient doit éviter toute activité sexuelle et ne pas utiliser l'implant pendant 6 semaines après l'intervention afin de permettre la cicatrisation.

La convalescence et l'arrêt de travail sont adaptés au métier que vous exercez.

RISQUES ET COMPLICATIONS

Dans la majorité des cas, l'intervention qui vous est proposée se déroule sans complication. Cependant, tout acte chirurgical comporte un certain nombre de risques et complications décrits ci-dessous.

Certaines complications sont liées à votre état général.

Toute intervention chirurgicale nécessite une anesthésie, qu'elle soit loco-régionale ou générale, qui comporte des risques. Elles vous seront expliquées lors de la consultation pré-opératoire avec le médecin anesthésiste.

LES COMPLICATIONS COMMUNES À TOUTE CHIRURGIE SONT :

- Infection locale, généralisée
- Le saignement avec hématome possible et parfois transfusion
- Phlébite et embolie pulmonaire
- Allergie

LES COMPLICATIONS DIRECTEMENT EN RELATION AVEC L'INTERVENTION SONT RARES, MAIS POSSIBLES :

↳ Le risque majeur est l'infection.

Elle peut être précoce (dans les jours qui suivent l'intervention), ou tardive, parfois plusieurs mois ou années plus tard. Certaines conditions pathologiques favorisent l'infection : le diabète, des antécédents de radiothérapie pelvienne ou de traumatisme pelvien avec lésion de l'urètre, les infections aiguës ou chroniques (urinaires, sinusiennes, dentaires), certaines affections neurologiques.

Si cet évènement se produit, la simple administration d'antibiotiques ne suffit pas le plus souvent. Il faut explanter (retirer) l'implant pénien avec une nouvelle anesthésie. Dans certaines situations, un implant d'attente, voire définitif, peut être substitué, mais dans d'autres situations aucun matériel n'est laissé en place. Il s'ensuit le plus souvent une fibrose totale ou partielle rendant toute érection très difficile, voire pratiquement impossible.

A plusieurs semaines ou mois de l'accident infectieux, il est possible de tenter la mise en place d'un nouvel implant, mais l'acte chirurgical est plus difficile et le risque d'une nouvelle infection n'est pas négligeable.

↳ Un hématome peut survenir

Il peut être évacué chirurgicalement ou se résorber de lui-même s'il est peu important.

↳ La panne mécanique de l'implant

Elle peut survenir à moyen ou long terme et peut nécessiter son changement chirurgical total ou partiel.

↳ L'absence de satisfaction sexuelle malgré un fonctionnement correct est éventuellement en rapport avec une diminution de longueur du pénis avec l'implant gonflé, ou alors avec un gland mou ou sensible.

SUIVI-OPÉRATOIRE

Une consultation postopératoire est programmée dans les 4 à 6 semaines qui suivent l'intervention afin de vérifier la qualité de la cicatrisation et le fonctionnement de l'implant.

Le patient est instruit du fonctionnement de l'implant au cours d'une ou plusieurs consultations afin d'acquérir le maniement qui lui permette une utilisation et une satisfaction optimales.

Les évènements qui doivent vous amener à contacter le service d'urologie ou le service d'urgences ou à consulter votre médecin généraliste ou votre urologue sont l'aggravation de la douleur, un écoulement par la cicatrice, le gonflement (œdème, hématome) du pénis ou la fièvre.

Il est rappelé que **toute intervention chirurgicale comporte un certain nombre de risques y compris vitaux**, tenant à des variations individuelles qui ne sont pas toujours prévisibles. Certaines de ces complications sont de survenue exceptionnelle (plaies des vaisseaux, des nerfs et de l'appareil digestif) et peuvent parfois ne pas être guérissables. Au cours de cette intervention, le chirurgien peut se trouver en face d'une découverte ou d'un événement imprévu nécessitant des actes complémentaires ou différents de ceux initialement prévus, voire une interruption du protocole prévu. Toute chirurgie nécessite une mise au repos et une diminution des activités physique. Il est indispensable de vous mettre au repos et de ne reprendre vos activités qu'après accord de votre chirurgien.

EN CAS D'URGENCE,
votre urologue vous donnera la conduite à tenir.

En cas de difficulté à le joindre,
faites le 15.

Fumer augmente le risque de complications chirurgicales de toute chirurgie, en particulier risque infectieux (X3) et difficulté de cicatrisation (X5). Arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant l'intervention diminue significativement ces risques. De même, Il est expressément recommandé de ne pas recommencer à fumer durant la période de convalescence.

↘ Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, votre chirurgien et votre anesthésiste ou appelez la ligne **Tabac-Info-Service au 3989** ou par internet : **tabac-info-Service.fr**, pour vous aider à arrêter.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

DOCUMENT DE CONSENTEMENT AUX SOINS

Dans le respect du code de santé publique (Article R.4127-36), je, soussigné (e) Monsieur, Madame, reconnaît avoir été informé (e) par le Dr en date du/...../....., à propos de l'intervention qu'il me propose : **pose d'un implant pénien.**

J'ai bien pris connaissance de ce document et j'ai pu interroger le Dr qui a répondu à toutes mes interrogations et qui m'a rappelé que je pouvais jusqu'au dernier moment annuler l'intervention.

Ce document est important. Il est indispensable de le communiquer avant l'intervention. En son absence, votre intervention sera annulée ou décalée.

Fait à

Le/...../.....

En 2 exemplaires,

Signature

Cette fiche a été rédigée par l'Association Française d'Urologie pour vous accompagner. Elle ne doit pas être modifiée. Vous pouvez retrouver le document original et des documents d'information plus exhaustifs sur le site urologie-santé.fr
L'Association Française d'Urologie ne peut être tenue responsable en ce qui concerne les conséquences dommageables éventuelles pouvant résulter de l'exploitation des données extraites des documents sans son accord.

PERSONNE DE CONFIANCE

Madame, Monsieur,

En application de la loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner » sur le droit des patients, il nous est demandé d'améliorer leur environnement proche lors de leur prise en charge.

En plus du consentement éclairé qui décrit l'indication et les risques de l'intervention que vous allez prochainement avoir, nous vous prions de trouver ci-joint une fiche de désignation d'une personne de confiance.

Cette désignation a pour objectif, si nécessaire, d'associer un proche aux choix thérapeutiques que pourraient être amenés à faire les médecins qui vous prendront en charge lors de votre séjour. C'est une assurance, pour vous, qu'un proche soit toujours associé au projet de soin qui vous sera proposé.

Elle participera aux prises de décisions de l'équipe médicale si votre état de santé ne vous permet pas de répondre aux choix thérapeutiques.

Nous vous remercions de bien vouloir remplir consciencieusement ce document et de le remettre à l'équipe soignante dès votre arrivée.

JE NE SOUHAITE PAS DÉSIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE

À

le/...../.....

Signature

JE SOUHAITE DÉSIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE

Cette personne est :

Nom : Prénom :

Lien (époux, épouse, enfant, ami, médecin....) :

Téléphone fixe :Téléphone portable :

Adresse :

.....

J'ai été informé(e) que cette désignation vaut pour toute la durée de mon hospitalisation. Je peux révoquer cette désignation à tout moment et dans ce cas, je m'engage à en informer par écrit l'établissement en remplissant une nouvelle fiche de désignation.

Date de confiance :

...../...../.....

Signature

Signature de la personne